



Autors: Cristina Álvarez¹, Montserrat Andreu¹, Victòria Andreu², Francesc Balaguer³, Xavier Bessa⁴, Enric Brullet⁴, Claudia Consiglieri⁵, Henry Córdova⁶, Esther Garcia Planella⁶, Montse Garcia Retortillo¹, Jordi Guardiola⁷, Manuela Hombrados⁷, Gemma Ibáñez⁸, Eva Martínez Bauer⁸, Laura Mora⁸, Leticia Moreira⁸, Agustí Panadès⁸, Maria Pellisé⁸, Marta Piqueras⁸, Ignasi Puig¹⁰, Francisco Rodríguez Moranta⁸, Agustín Seoane¹, Xavier Serra⁴, Francesc Vida¹⁰, Rafel Campo⁸.

Hospitals: H Mar¹, H Viladecans², H Clínic³, H Sabadell (C.S.U. Parc Taulí)⁴, H U Bellvitge⁵, H Sant Pau⁶, H U Girona Dr. J. Trueta⁷, Cl. Sagrada Família⁸, CST de Terrassa⁹, ALTHAIA X. A. Manresa¹⁰.

Preparació de còlon

Escala de Boston

	Còlon dret	Còlon transvers	Còlon esquerre	Global
Grau de neteja per cada segment	0-3	0-3	0-3	0-9

- 0 restes sòlides que impedeixen explorar tota la mucosa i no es poden aspirar (exploració impossible)
- 1 part de la mucosa no explorada (exploració parcial)
- 2 petites restes que permeten explorar tota la mucosa (exploració completa)
- 3 absència de restes (exploració completa)

Lai E, et al. *Gastrointestinal Endoscopy* 2009;69:620-5