



Autors: Cristina Álvarez¹, Montserrat Andreu¹, Victòria Andreu², Francesc Balaguer³, Xavier Bessa⁴, Enric Brullet⁴, Claudia Consiglieri⁵, Henry Córdova⁶, Esther Garcia Planella⁶, Montse Garcia Retortillo¹, Jordi Guardiola⁷, Manuela Hombrados⁷, Gemma Ibáñez⁸, Eva Martínez Bauer⁸, Laura Mora⁴, Leticia Moreira⁹, Agustí Panadès⁹, Maria Pellisé⁹, Marta Piqueras⁹, Ignasi Puig¹⁰, Francisco Rodríguez Moranta⁹, Agustín Seoane¹, Xavier Serra⁴, Francesc Vida¹⁰, Rafel Campo⁸.

Hospitals: H Mar¹, H Viladecans², H Clínic³, H Sabadell (C.S.U. Parc Taulí)⁴, H U Bellvitge⁵, H Sant Pau⁶, H U Girona Dr. J. Trueta⁷, Cl. Sagrada Família⁸, CST de Terrassa⁹, ALTHAIA X. A. Manresa¹⁰.

Malaltia inflamatòria intestinal

Índex de Rutgeerts (recurrència postquirúrgica M. Crohn)

Grau	Troballes endoscòpiques
i0	No lesions a l'ili distal
i1	≤ 5 lesions aftoses
i2	> 5 lesions aftoses amb mucosa normal o lesions disperses més grans, o lesions confinades a l'anastomosi
i3	Ileïtis aftosa difusa amb mucosa inflamada difusament
i4	Inflamació difusa amb úlceres, nòduls o estenosi

Rutgeerts P, et al. *Gastroenterology* 1990;99:956–63.