



Autors: Cristina Álvarez¹, Montserrat Andreu¹, Victòria Andreu², Francesc Balaguer³, Xavier Bessa⁴, Enric Brullet⁴, Claudia Consiglieri⁵, Henry Córdova⁶, Esther Garcia Planella⁶, Montse Garcia Retortillo¹, Jordi Guardiola⁷, Manuela Hombrados⁷, Gemma Ibáñez⁸, Eva Martínez Bauer⁸, Laura Mora⁴, Leticia Moreira⁹, Agustí Panadès⁹, Maria Pellisé⁹, Marta Piqueras⁹, Ignasi Puig¹⁰, Francisco Rodríguez Moranta⁶, Agustín Seoane¹, Xavier Serra⁴, Francesc Vida¹⁰, Rafel Campo⁸.

Hospitals: H Mar¹, H Viladecans², H Clínic³, H Sabadell (C.S.U. Parc Taulí)⁴, H U Bellvitge⁵, H Sant Pau⁶, H U Girona Dr. J. Trueta⁷, Cl. Sagrada Família⁸, CST de Terrassa⁹, ALTHAIA X. A. Manresa¹⁰.

Malaltia inflamatòria intestinal

Índex de Mayo (colitis ulcerosa)

| Punts | Lesions |
|-------|--|
| 0 | Normal o malaltia inactiva |
| 1 | Malaltia lleu (eritema, disminució del patró vascular, friabilitat lleu) |
| 2 | Malaltia moderada (eritema evident, absència de patró vascular, friabilitat, erosions) |
| 3 | Malaltia greu (hemorràgia espontània, ulceracions) |

(Troballes en la rectosigmoidoscòpia)

Schroeder KW, et al. *N Engl J Med* 1987;317:1625-9