



**Autors:** Victòria Andreu<sup>1</sup>, Enric Brullet<sup>2</sup>, Claudia Consiglieri<sup>3</sup>, Pilar Garcia Iglesias<sup>4</sup>, Esther Garcia Planella<sup>4</sup>, Montse Garcia Retortillo<sup>5</sup>, Jordi Guardiola<sup>6</sup>, Manuela Hombrados<sup>6</sup>, Gemma Ibáñez<sup>7</sup>, Leticia Moreira<sup>7</sup>, Maria Pellisé<sup>7</sup>, Marta Piqueras<sup>8</sup>, Veronica Pons<sup>9</sup>, Ignasi Puig<sup>10</sup>, Oriol Sendino<sup>7</sup>, Francesc Vida<sup>10</sup>, Rafel Campo<sup>2</sup>.

**Hospitals:** H Viladecans<sup>1</sup>, H Sabadell (C.S.U. Parc Taulí)<sup>2</sup>, H U Bellvitge<sup>3</sup>, H Sant Pau<sup>4</sup>, H Mar<sup>5</sup>, H U Girona Dr. J. Trueta<sup>6</sup>, H Clínic<sup>7</sup>, CST de Terrassa<sup>8</sup>, H U Vall d'Hebron<sup>9</sup>, ALTHAIA X. A. Manresa<sup>10</sup>.

## Hemorràgia digestiva alta

### Índex de Glasgow-Blatchford

Paràmetre		Puntuació
Urea (mg/dL)	≥ 6,5 - < 8	2
	≥ 8 - < 10	3
	≥ 10 - < 25	4
	≥ 25	6
Hemoglobina (g/dL)		
Home	≥ 12 - < 13	1
	≥ 10 - < 12	3
	< 10	6
Dona	≥ 10 - < 12	1
	< 10	6
TA sistòlica (mmHg)	100-109	1
	90-99	2
	< 90	3
FC	> 100 bpm	1
Presentació en forma de melena		1
Síncope		2
Malaltia hepàtica		2
ICC		2

**> 0 implica alt risc d'algun tipus d'intervenció o transfusió**

Blatchford O, et al. *Lancet* 2000;356:1318-21